

# Paziente in PS con insufficienza respiratoria (SARI/ARDS)

- SpO<sub>2</sub> ≤ 92% in aria ambiente
- Caso sospetto per Covid 19

## Ossigeno terapia convenzionale / CPAP

- No cannule nasali
- Maschera facciale da 6 o 12 l/m reservoir
- Maschera Venturi fino a FiO<sub>2</sub> 60%
- Ev. CPAP alti flussi in mask/casco

Se responder:  
PS sino ad esito tampone

- Valutazione Internistica
- Valutazione Anestesiologica

## URT (III Piano)

Miglioramento

## Area Medica

Prosecuzione ossigenoterapia  
ev. CPAP maschera alti flussi

- Ipossia Sao<sub>2</sub> ≤ 92%
- Ipercapnia
- Dispnea/polipnea

## Valutazione anestesiologica

- NIV (1-2 ore)
- ev. intubazione (in URT)

## Terapia Intensiva 6° posto letto

Ventilazione protettiva  
ev. pronazione

1) Se tampone positivo → CENTRO HUB di riferimento

2) Se tampone negativo → Rivalutazione TEAM  
ripetere secondo tampone (a 24/48 h)  
T.I.: lasciare in stanza 6 fino ad esito del II tampone  
se negativo: Terapia Intensiva e/o altri Reparti

**Dott. Giancarlo Parisi**  
Direttore UOC Medicina Interna  
P.O. Piove di Sacco AULSS6 Euganea  
Regione Veneto

**Dott. Gian Claudio Falasco**  
Direttore Anestesia e Rianimazione  
P.O. Piove di Sacco AULSS6 Euganea  
Regione Veneto